


ALKOHOLINKÄYTTÖ AUDIT-PISTEIN

MITATTUNA 2000–2016 (% , yo ja amk, miehet, naiset)

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ



RUNSAAN JUOMISEN YLEISYYTTÄ KUVAAVIA TIETOJA AUDITISTA 2008 JA 2012

		AMK			YO		
		2016	2012	2008	2016	2012	2008
Humalajuominen							
vähintään 7 annosta kerralla	miehet	33	41	49	28	31	32
vähintään 5 annosta kerralla	naiset	43	45	43	31	33	30
Vähintään 10 annosta kerralla	miehet	17	22	27	13	13	18
Vähintään 7 annosta kerralla	naiset	16	17	17	10	10	10
Vähintään 6 annosta ainakin viikoittain	miehet	19	18	26	16	20	27
	naiset	7	5	8	6	6	8
Syällisyys tai katumus juomisen jälkeen ainakin kuukausittain	miehet	7	13	16	10	12	14
	naiset	9	9	10	9	9	8
Muistin katkeaminen ainakin kuukausittain	miehet	10	10	15	8	8	10
	naiset	7	5	6	5	3	3
Saanut kehotuksen vähentää tai lopettaa juominen viimeisen vuoden aikana	miehet	7	10	12	7	8	10
	naiset	4	4	6	4	3	3

AUDIT-PISTEIDEN KESKIJARVO 2004–2016 ja ITSEARVIOIDUN KULUTUKSEN KESKIJARVO (puhtaana alkoholina kg/v) 2000–2016 (yo, miehet ja naiset)

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

